

Schlaganfall: Ergebnisse der BAGSO*-Befragung 2016¹

Vielen unbekannt: Vorhofflimmern und Diabetes als Risikofaktoren für Schlaganfall



51%

der Befragten wissen **nicht**, dass Vorhofflimmern ein Schlaganfallrisikofaktor ist



49%

der Befragten wissen **nicht**, dass Diabetes mellitus das Risiko für einen Schlaganfall erhöht

Sind die Risikofaktoren bekannt und werden sie behandelt, kann das Schlaganfallrisiko gesenkt werden.

Wissenslücken: Typische Schlaganfallsymptome sind bekannt, aber eine Vielzahl ist nicht bekannt



91%

der Befragten kennen **halbseitige Lähmungen** als Schlaganfallsymptom



Nur 56%

der Befragten können **Gleichgewichtsstörungen** als Symptom für einen Schlaganfall zuordnen



89%

der Befragten sind **Sprachstörungen** als Symptom bekannt



Nur 51%

der Befragten wissen, dass **vorübergehender Sehverlust** ein Anzeichen ist

Betroffene und Angehörige können einen Schlaganfall nur erkennen, wenn die Symptome bekannt sind!

Schlaganfall: Wissen sinkt im Alter



Fast 85 Prozent aller Schlaganfälle treten jenseits des 60. Lebensjahres auf.²